

Promova uma limpeza 3D no canal radicular com o SmartLite Pro EndoActivator™



Redução de bactérias 150 vezes maior¹

Comparado com a imersão
de um minuto em hipoclorito,
ativada manualmente.

1. Internal data on file.



Limpeza mais eficaz em apenas 90 segundos¹

Com movimento multidirecional

1. Internal data on file.



Dentsply LLC – 1301, Smile Way, York, PA T7404, Estados Unidos.

Detentor da notificação: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 863
Distrito Industrial – CEP 88104-785 – São José/SC – CNPJ 12.483.930/0001-22 – <http://www.dentsplysirona.com> – SAC: 0800 771 2226 | 11 3046-2222.

Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo – CRF-SC: 8326, ANVISA nº 80745408235 (SmartLite Pro EndoActivator).



Descomplicando a Irrigação nos Canais

Dentistas sabem que a limpeza do conduto é fundamental para se obter melhores resultados. No entanto, uma irrigação passiva não é o suficiente. Ativar as soluções irrigadoras dentro do conduto pode abrir mais túbulos dentinários e permitir uma melhor obturação de canais acessórios e laterais.



#1

¹A principal preocupação dos dentistas ao realizar um tratamento endodôntico é a **limpeza dos condutos**².

Porque **35%**

ou mais das paredes do **canal não são tocadas** após a instrumentação. O sucesso de um procedimento endodôntico a longo prazo depende de um conduto limpo³.




Uma irrigação passiva pode levar até **40 minutos** para eliminar bactérias de forma eficaz⁴.



Normalmente, o tempo médio de irrigação é de **2.5 minutos**,⁵ onde bactérias podem permanecer, comprometendo o tratamento⁶.

➡ **ATIVAR A SOLUÇÃO IRRIGADORA FAZ DIFERENÇA!**

Não tratado



Tratado com ativação

A ativação resulta em uma superfície mais limpa, com **maior abertura dos túbulos dentinários e menos resíduos remanescentes**¹.

PRONTO PARA REVOLUCIONAR SUA IDEIA DE LIMPEZA?

1. Kanter V, Weldon E, Nair U, et al. Uma análise quantitativa e qualitativa dos sistemas endodônticos ultrassônicos versus sônicos na limpeza e obturação de canais. "Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod". 2011;112(6):809-813. doi:10.1016/j.tripleo.2011.06.002. 2. 2021 Dental Omnibus, Pesquisa de Mercado do Key Group. 3. Peters, O. A., K. Schonenberger, e A. Laib. Efeitos de Quatro Técnicas de Preparação Ni-Ti na Geometria do Canal Radicular Avaliada por Microtomografia Computadorizada. "International Endodontic Journal Int Endod J". 34:3 (2001): 221-30. 4. Retamozo B, Shabahang S, Johnson N, Aprecio RM, Torabinejad M. Tempo mínimo de contato e concentração de hipoclorito de sódio necessários para eliminar "Enterococcus faecalis". "J Endod". Mar 2010;36(3):520-3. doi:10.1016/j.joen.2009.12.005. PMID: 20171375. 5. DIG Insights; Baseado nos protocolos típicos de irrigação realizados por dentistas gerais após o preparo/instrumentação, mas antes da obturação. n=201. 6. Dados em arquivo.